

V Congreso Nacional de la SEOVE

Sociedad Española De Odontología
Veterinaria

Zaragoza 11 y 12 de diciembre de 2009

Ponencias y conferencias presentadas en este
Congreso

Título:

ALTERACIONES MÁS FRECUENTES EN LOS INCISIVOS DE LOS CABALLOS

Autor: Carla Manso

Centro o Institución: **CLINICA PRIVADA. MADRID**

Los incisivos de los caballos presentan alteraciones con bastante frecuencia. Siendo también las que resultan más fácilmente diagnosticadas y tratadas por el veterinario debido a que se observan a simple vista.

En los incisivos de los caballos podemos encontrar las siguientes alteraciones:

Incisivos deciduos retenidos: es muy frecuente en animales estabulados ya que no están todo el día utilizando sus incisivos para cortar comida. Nos podrá dar lugar a signos clínicos como alteraciones en la alimentación, montado, cambios de carácter, fiebre... Dependiendo de la localización del diente y del momento en el que lo diagnostiquemos el tratamiento variará .

Persistencia de los dientes de leche por no erupcionar el permanente como consecuencia de una alteración genética.

Presencia de fragmentos de incisivos deciduos, pudiendo estos dificultar la erupción de los permanentes y/o dar lugar a infecciones.

Erupción desplazada de incisivos permanentes: por haber tenido retenido el de leche, genética o traumatismo

Alteraciones en el número de incisivos: pudiendo ser de origen genético (polidoncia u oligodoncia) o traumático (bastante frecuente), afectando a los incisivos de leche o permanentes.

Alteraciones en la longitud de la mandíbula: dando lugar a distintos grados de braquignatismo o prognatismo. Siendo el braquignatismo mandibular mucho más frecuente que el prognatismo. Estas alteraciones darán lugar a distinto grado de dificultad para comer y/o montado.

Fracturas dentales por traumatismo, faltando o no fragmentos de incisivos de leche o permanentes.

Alteraciones en el ángulo de unión de los incisivos: normalmente asociado a casos de prognatismo o braquignatismo en distintos grados.

Alteraciones genéticas de la forma y/o la estructura: de uno o varios incisivos, de leche o permanentes.

Desplazamiento lateral de la mandíbula: afectando esto a los incisivos.

Desgaste de los incisivos: como consecuencia de distintos vicios de cuadra.

Caries: muy poco frecuente en incisivos

Infecciones en uno o más incisivos deciduos o permanentes

Presencia de sarro, asociada o no a enfermedad periodontal.

Presencia de tumores: siendo el odontoma el más frecuente. Son tumores de crecimiento rápido que se deben operar.

Todas estas alteraciones las encontramos de forma más o menos frecuente en la clínica diaria; y deberán ser correctamente diagnosticadas para poder realizar después el tratamiento que sea necesario.

De todos los caballos revisados en un estudio realizado por los autores en 400 animales a los que se les realizó un examen dental, en 113 animales se observó algún tipo de alteración.
